

文科高等数学

2.2 矩阵及其运算

2.2.1 矩阵的概念

定义 我们将形如

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

的矩形数表,称为 $m \times n$ 阶矩阵,其中 m 与 n 分别是矩阵 A 的行数和列数,矩阵中的第 i 行与第 j 列 ($1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n$) 处的 a_{ij} 称为矩阵 A 的第 i 行第 j 列元素,当 $m = n$ 时, A 特别称为 n 阶方阵或 n 阶矩阵. 当 $m = n = 1$ 时,矩阵就是一个数,不再加括号表示.

一般用大写的黑体拉丁字母表示矩阵 $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}$ 等, 有时矩阵也可以简写成 $\mathbf{A} = (a_{ij})_{m \times n}$, 表示矩阵 $\mathbf{A}$ 的第 i 行第 j 列元素为 a_{ij} , $1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n$.

两个 $m \times n$ 阶矩阵 $\mathbf{A} = (a_{ij})_{m \times n}$ 与 $\mathbf{B} = (b_{ij})_{m \times n}$ 称为相等的, 如果 $a_{ij} = b_{ij} (1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n)$, 记为 $\mathbf{A} = \mathbf{B}$. 注意, 行数或列数不等的矩阵绝不能相等.

例 2.2.3

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

如果矩阵 $\mathbf{A} = (a_{ij})_{m \times n}$ 的 mn 个元素均为 0, 则称 $\mathbf{A}$ 为零矩阵, 记作 $\mathbf{O}_{m \times n}$, 常简记为 $\mathbf{O}$, 而不标明下标 $m \times n$.

如果把 $m \times n$ 阶矩阵 $A = (a_{ij})_{m \times n}$ 的第 i 行改为第 i 列, 第 j 列改为第 j 行, 则可以得到一个新的 $n \times m$ 矩阵, 记作 A^T , 称为 A 的转置(矩阵), 具体表示如下:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}, \quad A^T = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{m2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

显然, n 阶方阵的转置仍是 n 阶方阵, 而且对任何矩阵 A , 有 $(A^T)^T = A$.

例 2.2.2 对于 n 元线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \cdots \cdots \cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m. \end{cases}$$

由方程组左端 mn 个系数(缺省的算 0)相互位置不变所得到的矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

称为方程组的系数矩阵

$$\bar{\mathbf{A}} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{pmatrix}$$

称为线性方程的增广矩阵

2.2.2 矩阵的加法和倍数

1. 矩阵的加减

两个行数相同列数也相同的矩阵称为同型矩阵,只有同型矩阵才可以做加减法. 做加法时,把两矩阵中对应位置处的元素相加,和数放在原位置处,即得到行列数不变的新矩阵,称为原来两矩阵的和,对于减法即两矩阵的差,可以类似地定义.

定义 设矩阵

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \cdots & b_{mn} \end{pmatrix}.$$

$$\mathbf{A} + \mathbf{B} = \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & \cdots & a_{1n} + b_{1n} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & \cdots & a_{2n} + b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} + b_{m1} & a_{m2} + b_{m2} & \cdots & a_{mn} + b_{mn} \end{pmatrix};$$

两矩阵的差为矩阵

$$\mathbf{A} - \mathbf{B} = \begin{pmatrix} a_{11} - b_{11} & a_{12} - b_{12} & \cdots & a_{1n} - b_{1n} \\ a_{21} - b_{21} & a_{22} - b_{22} & \cdots & a_{2n} - b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} - b_{m1} & a_{m2} - b_{m2} & \cdots & a_{mn} - b_{mn} \end{pmatrix}.$$

矩阵的加(减)运算转化为对应元素(即实数)的加(减)运算

容易验证,矩阵的加法具有下列基本性质:

- (1) 交换性 $A + B = B + A$.
- (2) 结合性 $(A + B) + C = A + (B + C)$.
- (3) 零矩阵的单位性 $A + O = O + A = A$
(零矩阵:所有元素均为 0 的矩阵).
- (4) 保持转置性 $(A + B)^T = A^T + B^T$.
- (5) 负矩阵的存在性 即对任意矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}, \text{称} \begin{pmatrix} -a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ -a_{21} & -a_{22} & \cdots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ -a_{m1} & -a_{m2} & \cdots & -a_{mn} \end{pmatrix}$$

为 A 的负矩阵,记作 $-A$,且有 $A + (-A) = (-A) + A = O$.

显然,若 A 与 B 是同型矩阵,则 $A - B = A + (-B)$.

定义 设 k 为一实数,

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix},$$

则 A 的 k 倍(或称为 A 与数 k 的数乘)是与 A 同型的矩阵:

$$kA = \begin{pmatrix} ka_{11} & ka_{12} & \cdots & ka_{1n} \\ ka_{21} & ka_{22} & \cdots & ka_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ ka_{m1} & ka_{m2} & \cdots & ka_{mn} \end{pmatrix}.$$

容易验证,对任意矩阵 A , 我们有 $0 A = \mathbf{O}$, $1 A = A$, $(-1)A = -A$, 并且矩阵与数的乘法具有下列基本性质:

(1) 对加法的分配性 $k(A + B) = kA + kB$, $(k + l)A = kA + lA$.

(2) 结合性 $k(lA) = (kl)A = l(kA)$.

(3) 保持转置性 $(kA)^T = kA^T$.

矩阵的倍数运算转化为实数的乘法运算.

例 2.2.4 已知

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 8 \\ 2 & 4 & 6 & 9 \end{pmatrix}, \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 7 & 4 & -3 & 3 \\ 3 & 1 & 0 & 7 \\ 5 & 2 & 3 & 9 \end{pmatrix},$$

且 $\mathbf{A} + 3\mathbf{X} = \mathbf{B}$, 求矩阵 $\mathbf{X}$.

解 由 $\mathbf{A} + 3\mathbf{X} = \mathbf{B}$ 得 $3\mathbf{X} = \mathbf{B} - \mathbf{A}$, 所以

$$\mathbf{X} = \frac{1}{3}(\mathbf{B} - \mathbf{A}) = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 7-3 & 4-(-2) & -3-2 & 3-0 \\ 3-1 & 1-3 & 0-0 & 7-8 \\ 5-2 & 2-4 & 3-6 & 9-9 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 4 & 6 & -5 & 3 \\ 2 & -2 & 0 & -1 \\ 3 & -2 & -3 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{4}{3} & 2 & -\frac{5}{3} & 1 \\ \frac{2}{3} & -\frac{2}{3} & 0 & -\frac{1}{3} \\ 1 & -\frac{2}{3} & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

2.2.3 矩阵的乘法

定义 设 $A = (a_{ij})_{mn}$, $B = (b_{jk})_{np}$ 分别是 $m \times n$, $n \times p$ 矩阵, 则矩阵 A 与 B 的乘积是一 $m \times p$ 矩阵, 记为

$$C = AB = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1p} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2p} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{mp} \end{pmatrix},$$

其中 A 称为左阵, B 称为右阵, 且乘积矩阵 C 中第 i 行第 k 列处元素为

$$c_{ik} = a_{i1}b_{1k} + a_{i2}b_{2k} + \cdots + a_{in}b_{nk}$$

矩阵的乘法似乎非常复杂,但是注意观察不难发现,把 A 的第 i 个行向量与 B 的第 k 个列向量(都是矩阵)相乘,就得到 1×1 阶矩阵,也就是一个数

$$\begin{pmatrix} a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{1k} \\ b_{2k} \\ \vdots \\ b_{nk} \end{pmatrix} = a_{i1}b_{1k} + a_{i2}b_{2k} + \cdots + a_{in}b_{nk},$$

此数恰巧就是矩阵 AB 的第 i 行第 k 列元素 c_{ik} . 这就是说矩阵 AB 的第 i 行第 k 列元素就是 A 的第 i 个行向量与 B 的第 k 个列向量的乘积.

由定义可以看出,在矩阵乘法中,左阵总是以行为单位参加运算,而右阵总是以列为单位参加运算

例 2.2.6 设

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \end{pmatrix}, \mathbf{B} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix},$$

求 $\mathbf{AB}$ 与 $\mathbf{BA}$.

解 $\mathbf{AB} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n$, 而 $\mathbf{BA} = \begin{pmatrix} b_1 a_1 & b_1 a_2 & \cdots & b_1 a_n \\ b_2 a_1 & b_2 a_2 & \cdots & b_2 a_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_n a_1 & b_n a_2 & \cdots & b_n a_n \end{pmatrix}.$

例 2.2.7 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 4 & -1 & 5 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 4 & 1 \\ -1 & 2 & 2 & 0 \\ 4 & 5 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 求 AB .

解 此处 A 是 2×3 矩阵, B 是 3×4 矩阵, A 的列数等于 B 的行数, 故 AB 有意义, 其积矩阵 C 应是 2×4 矩阵. 据定义有

$$C = AB =$$

$$\begin{bmatrix} 1 \cdot 2 + 3 \cdot (-1) + (-2) \cdot 4 & 1 \cdot (-3) + 3 \cdot 2 + (-2) \cdot 5 & 1 \cdot 4 + 3 \cdot 2 + (-2) \cdot 1 & 1 \cdot 1 + 3 \cdot 0 + (-2) \cdot 1 \\ 4 \cdot 2 + (-1) \cdot (-1) + 5 \cdot 4 & 4 \cdot (-3) + (-1) \cdot 2 + 5 \cdot 5 & 4 \cdot 4 + (-1) \cdot 2 + 5 \cdot 1 & 4 \cdot 1 + (-1) \cdot 0 + 5 \cdot 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -9 & -7 & 8 & -1 \\ 29 & 11 & 19 & 9 \end{pmatrix}$$

例 2.2.8 设 $A = \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -16 & -32 \\ 8 & 16 \end{pmatrix}$, 求 AB, BA .

解 $AB = \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -16 & -32 \\ 8 & 16 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 64 & 128 \\ -32 & -64 \end{pmatrix},$

$$BA = \begin{pmatrix} -16 & -32 \\ 8 & 16 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

由例 2.2.8 可见,一般说来,矩阵的乘法是不可交换的,甚至像例 2.2.6 中那样, AB 与 BA 是两个完全不同型的矩阵. 从例 2.2.7 来看,更有甚之,即使 AB 是可乘的,但 BA 就根本无意义了. 此外,例 2.2.8 的乘积 $BA = O$,说明两个均非零的矩阵,其乘积可能等于零.

矩阵的乘法具有下列基本性质:

- (1) 结合性 $(AB)C = A(BC)$.
- (2) 对加法的分配性 $(A+B)C = AC + BC, C(A+B) = CA + CB$.
- (3) 对数乘的结合性 $k(AB) = (kA)B = A(kB)$.
- (4) 关于转置 $(AB)^T = B^T A^T$.

4. 单位矩阵

在矩阵的乘法中,有一种矩阵起着特殊的作用,如同数的乘法中的1,称这种矩阵为单位矩阵.它是个方阵,除左上角到右下角的对角线(称为主对角线)上的元素均为1以外全都为0,即

$$I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}.$$

若 A 是 $m \times n$ 阶矩阵,则容易验证 $I_m A = A I_n = A$. 我们把 $I_m A$ 称为用 m 阶单位矩阵 I_m 左乘以 A ,同理, $A I_n$ 称为 I_n 右乘以 A . 上式可以简言之,任何矩阵左乘或右乘一个单位矩阵,其积仍为该矩阵.

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 1 \\ -1 & 2 & 0 \\ 4 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 将 AB 写作 $\begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{pmatrix}$,
 则 $a =$ [填空1], $b =$ [填空2], $c =$ [填空3], $d =$ [填空4], $e =$ [填空5], $f =$ [填空6]

正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂

作答

已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix}$, 其中 a, b, c 为实数 , 且 $A^3 = I$, I 为二阶单位矩阵。则 $a =$ [填空1] , $b =$ [填空2] , $c =$ [填空3]

正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂

作答

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 5 & -4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 1 & 10 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$, 记 $AB - C = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, 则 $a =$ [填空1], $b =$ [填空2], $c =$ [填空3], $d =$ [填空4] .

正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂

作答

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$, 记 $AB - 2C = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, 则 $a =$ [填空1], $b =$ [填空2], $c =$ [填空3], $d =$ [填空4].

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$, 记 $AB - BC = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, 则 $a =$ [填空1], $b =$ [填空2], $c =$ [填空3], $d =$ [填空4].

设 A 为 n 阶方阵, 则将 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 的元素按原位置构成的行列式记为 $|A|$ 或 $\det A$, 称为 n 阶方阵 A 的行列式.

定理 2.2.1 设 A, B 为 n 阶方阵, 则 $|AB| = |A| \cdot |B|$, 即同阶方阵乘积的行列式等于各自行列式的乘积

设 A 为3阶方阵，若 $\det(A)=4$ ，则 $\det(2A)=$

- ☐ A 8
- ☐ B 12
- ☐ C 16
- ☒ D 32

提交

2. 矩阵的乘法和线性方程组的关系

采用矩阵的乘法,一般 n 元线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \dots\dots\dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

可以非常简单地表示为矩阵方程 $\mathbf{A}\mathbf{X} = \mathbf{B}$, 其中 $\mathbf{A}$ 为线性方程组的系数矩阵,

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \mathbf{B} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

分别表示未知数构成的 $n \times 1$ 矩阵与已知常数项构成的 $m \times 1$ 矩阵. 这就把一个非常复杂的线性方程组表示成与最简单的数字方程 $ax = b$ 相类似的形式.

2.2.4 初等变换和矩阵的秩

$$\text{对于三元线性方程组} \begin{cases} x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 8, & \textcircled{1} \\ 5x_2 + 2x_3 = -4, & \textcircled{2} \\ -2x_1 - 3x_3 = 2 & \textcircled{3} \end{cases}$$

的增广矩阵是 $\bar{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & 8 \\ 0 & 5 & 2 & -4 \\ -2 & 0 & -3 & 2 \end{pmatrix}.$

该方程组的消元解法如下：

先用①式的2倍加到③式上,即可消去③式中的未知数 x_1 ,得到一个同解方程组

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 8, & \textcircled{1} \\ 5x_2 + 2x_3 = -4, & \textcircled{2} \\ 4x_2 - 9x_3 = 18, & \textcircled{4} \end{cases}$$

增广矩阵变为

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & 8 \\ 0 & 5 & 2 & -4 \\ 0 & 4 & -9 & 18 \end{pmatrix}.$$

再用②式的 $-\frac{4}{5}$ 倍加到④式上, 又得同解方程组

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 8, & \text{①} \\ 5x_2 + 2x_3 = -4, & \text{②} \\ -\frac{53}{5}x_3 = \frac{106}{5}, & \text{⑤} \end{cases}$$

增广矩阵变为

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & 8 \\ 0 & 5 & 2 & -4 \\ 0 & 0 & -\frac{53}{5} & \frac{106}{5} \end{pmatrix}.$$

再在方程⑤的两边乘以 $-\frac{5}{53}$, 又得同解方程组

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 8, & \text{①} \\ 5x_2 + 2x_3 = -4, & \text{②} \\ x_3 = -2, & \text{⑥} \end{cases}$$

增广矩阵变为

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & 8 \\ 0 & 5 & 2 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

然后再将 $x_3 = -2$ 代入②式可得 $x_2 = 0$, 最后将 $x_2 = 0, x_3 = -2$ 代入①式即得方程组解 $x_1 = 2, x_2 = 0, x_3 = -2$.

以上增广矩阵的变化就是矩阵的初等行变换. 除去这些行变换外, 还有一种很有用的行变换是交换矩阵的两行, 相当于交换两个方程的次序. 综合以上三种变换, 我们有以下定义.

定义 对矩阵 A 施行的下列三种变换称为 A 的初等行变换:

- (1) 交换 A 的第 i 行与第 j 行, 记作 $R_i \leftrightarrow R_j$;
- (2) 用一个非零实数 c 乘以 A 的第 i 行, 即用该数乘以该行的每个元素, 所得各数按原来次序作为同一行的元素, 记作 $R_i \cdot c$;
- (3) 用一实数 c 乘以 A 的第 j 行 (如 (2) 中所述) 后, 再加到 A 的第 i 行上, 记作 $R_i + R_j \cdot c$ (称为第 i 行加上第 j 行的 c 倍).

定义 矩阵中每一行第一个非零元素(称为该行的非零首元)必在上一行非零首元的右下方,称这样的矩阵为阶梯形矩阵.

例 2.2.9 设

$$(1) \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 & 5 \\ 0 & 0 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$(2) \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 & 5 \\ 0 & 0 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix},$$

$$(3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 & 5 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & -2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix},$$

$$(4) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 & 5 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & -2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix},$$

其中(1),(2),(4)是阶梯形矩阵;而(3)不是,因为其第5行非零首元3不在上一行非零首元-1的右下方,而是在-1的正下方.

定理 2.2.2 任意矩阵 A 均可经有限次初等行变换化为阶梯形矩阵.

矩阵 A 经过初等行变换后化成的阶梯形矩阵的非零行数称为矩阵 A 的秩, 记为 $r(A)$.

虽然任一矩阵 A 经过初等变换化成的阶梯形矩阵不唯一, 但所有化成的阶梯形矩阵都具有相同的非零行数, 即 $r(A)$ 是被 A 唯一确定的.

例 2.2.10 将下列矩阵化为阶梯形阵:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 2 & -1 & 5 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 3 \\ 2 & 7 & 3 & 0 & 6 \\ 0 & -2 & 5 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

解

$$\begin{aligned} A &\xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 3 & 2 & -1 & 5 \\ 2 & 7 & 3 & 0 & 6 \\ 0 & -2 & 5 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 + R_1 \times (-2)} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 3 & 2 & -1 & 5 \\ 0 & 9 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 5 & 1 & 0 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{R_2 + R_4 \times 1} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 7 & 0 & 5 \\ 0 & 9 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 5 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} R_3 + R_2 \times (-9) \\ R_4 + R_2 \times 2 \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 7 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & -60 & 0 & -45 \\ 0 & 0 & 19 & 1 & 10 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & \xrightarrow{R_3 \times \left(-\frac{1}{15}\right)} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 7 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 4 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 19 & 1 & 10 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_4 + R_3 \times (-5)} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 7 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 4 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & -5 \end{pmatrix} \\
 & \xrightarrow{R_3 \leftrightarrow R_4} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 7 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & -5 \\ 0 & 0 & 4 & 0 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_4 + R_3 \times 4} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 7 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & -17 \end{pmatrix} = \mathbf{B}. \\
 & \mathbf{B} \xrightarrow{R_4 \times \frac{1}{4}} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 7 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{17}{4} \end{pmatrix} = \mathbf{C}
 \end{aligned}$$

矩阵 $\mathbf{B}$ 和矩阵 $\mathbf{C}$ 都是阶梯形矩阵. 显然, 同一矩阵 $\mathbf{A}$ 化成的阶梯形矩阵不唯一, 但阶梯形矩阵的非零行数是唯一的, 故 $r(\mathbf{A}) = 4$.

例 2.2.11 把矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & -2 & 4 & 5 \\ 1 & 10 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ 化为阶梯形, 并求 A 的秩.

解

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & -2 & 4 & 5 \\ 1 & 10 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow[R_3 - R_1]{R_2 - R_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -4 & 1 & 1 \\ 0 & 8 & -2 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 + R_2 \cdot 2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -4 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

此即 A 的一个阶梯形矩阵, 且因其有 2 个非零行 (第 1 行与第 2 行), 故 $r(A) = 2$.

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ -3 & 2 & -3 \end{pmatrix}$, 则 $r(A) =$

- ☐ A 1
- ☐ B 2
- ☒ C 3
- ☐ D 4

提交

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & -3 & 1 \\ -2 & 2 & -4 \end{pmatrix}$, 则 $r(A) =$

- ☐ A 1
- ☒ B 2
- ☐ C 3
- ☐ D 4

提交

矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ 的秩为

- ☐ A 1
- ☒ B 2
- ☐ C 3
- ☐ D 4

提交

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 & 1 \\ 2 & 1 & 11 & 2 \\ 11 & 4 & 56 & 5 \\ 2 & -1 & 5 & -6 \end{pmatrix}$, 则 $r(A) =$

- ☐ A 1
- ☐ B 2
- ☒ C 3
- ☐ D 4

提交

2.2.5 逆矩阵

定义 设 A 是 n 阶方阵, 若存在 n 阶矩阵 B 使得 $AB = BA = I_n$, 则称 A 是可逆的, 或说 A 是可逆矩阵, 而 B 称为 A 的逆矩阵, 记为 $A^{-1} = B$.

例 2.2.12 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -5 & 3 \end{pmatrix}$, 则存在 $B_1 = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$, 满足

$$AB_1 = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -5 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$B_1A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -5 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \text{ 可知 } A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}.$$

由逆矩阵定义及例 2.2.12, 提出下面 3 个问题:

(1) 在例 2.2.12 中找到的 B_1 矩阵是否唯一? (即是否还有 $B_2 (B_1 \neq B_2)$ 使得 $AB_2 = B_2A = I$).

(2) 是否所有 n 阶方阵 A 都存在逆矩阵, 即存在 n 阶方阵 B 满足 $AB = BA = I$? (相对应实数中, 是否所有实数 a , 都有 a^{-1} 存在, 使得 $a \cdot a^{-1} = 1$, 结论是否定的, 要求 $a \neq 0$).

(3) 若 n 阶方阵 A 可逆, 如何求出 A^{-1} .

现在来解答上述 3 个问题.

(1) 逆矩阵是唯一的.

若 B_1, B_2 都是 A 的逆矩阵, 则由逆矩阵定义

$$AB_1 = B_1A = I_n, \quad \text{且} \quad AB_2 = B_2A = I_n,$$

故
故

$$B_1 = B_1I = B_1(AB_2) = (B_1A)B_2 = I_nB_2 = B_2,$$

逆矩阵是唯一的.

(2) 由定理 2.2.1 可知:若 A, B 为 n 阶方阵,则

$$|AB| = |A| \cdot |B|.$$

特殊地,若 A 为 n 阶可逆方阵, A^{-1} 存在,

故 $|AA^{-1}| = |A| \cdot |A^{-1}|,$

而 $|AA^{-1}| = |I_n| = 1,$

因此:(i) $|A| \neq 0;$

$$(ii) |A^{-1}| = \frac{1}{|A|} = |A|^{-1}.$$

这是矩阵可逆的一个必要条件,同时也提供了判断给定矩阵是否可逆的有效方法.事实上,矩阵行列式不为零也是矩阵可逆的充分条件.

定理 2.2.3 n 阶方阵 A 可逆的充分必要条件是 $|A| \neq 0$

推论 n 阶矩阵 A 可逆的充分必要条件是 A 的秩为 n , 即 $r(A) = n$.

例 2.2.13 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 4 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}$, 由于

$$|A| = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 4 \\ 2 & -1 & 0 \end{vmatrix} = 2 \neq 0,$$

所以 A 是可逆矩阵.



$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}^{-1} \text{ 不存在的}$$

(3) 若 n 阶方阵 A 可逆, 则用初等变换的方法, 求逆矩阵 A^{-1} .

设 A 为 n 阶可逆矩阵, 构造 $n \times 2n$ 阶矩阵 $(A I_n)$, 对此矩阵作一系列初等行变换, 化为 $(I \ B)$, 则 B 即为所求 A^{-1} .

例 2.2.14 求 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 4 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}$ 的逆矩阵.

解 构造矩阵 $(A I_3) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 对其作一系列初等行变换,

化为 (I, B) , B 即为所求 A^{-1} .

$$\begin{aligned}
 (\mathbf{A} \ \mathbf{I}_3) &\xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 + R_1 \times (-2)} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & -8 & 0 & -2 & 1 \end{pmatrix} \\
 &\xrightarrow{R_3 + R_2 \times 3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 3 & -2 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \times \left(-\frac{1}{2}\right)} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{3}{2} & 1 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \\
 &\xrightarrow[\begin{matrix} R_2 + R_3 \times (-2) \\ R_1 + R_3 \times (-4) \end{matrix}]{\begin{matrix} R_2 + R_3 \times (-2) \\ R_1 + R_3 \times (-4) \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 6 & -3 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 4 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{3}{2} & 1 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 + R_2 \times (-1)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 4 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{3}{2} & 1 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

因此 $\mathbf{A}^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 4 & -2 & 1 \\ -\frac{3}{2} & 1 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$

可以验证 $\mathbf{A}^{-1}\mathbf{A} = \mathbf{A}\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{I}_3$.

逆矩阵的基本性质:若 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 为可逆矩阵,则

$$(1) (\mathbf{A}^{-1})^{-1} = \mathbf{A}.$$

$$(2) (\mathbf{AB})^{-1} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}^{-1}.$$

$$(3) (\mathbf{A}^T)^{-1} = (\mathbf{A}^{-1})^T.$$

$$(4) \text{ 设 } k \neq 0 \text{ 实数, 则 } (k\mathbf{A})^{-1} = \frac{1}{k}\mathbf{A}^{-1}.$$

设 A, B 为3阶可逆方阵，若 $\det(A)=4$ ， $\det(B)=2$ ，则 $\det(A^{-1}B)=$

☐ A $1/8$

☒ B $1/2$

☐ C 1

☐ D 2

提交

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$, 记 $(A + B)A^{-1} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, 则 $a =$
 [填空1], $b =$ [填空2], $c =$ [填空3], $d =$ [填空4].

正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂

作答

2.2.6 解可逆矩阵方程

1. 设 A 为 m 阶可逆矩阵, B 为 $m \times n$ 阶矩阵, 求解矩阵方程 $AX = B$.

构造 $m \times (m + n)$ 阶矩阵 $(A \ B)$, 对此矩阵作一系列初等行变换, 化为 $(I \ X)$, 则 X 即为所求 $X = A^{-1}B$.

例 2.2.15 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -1 & 4 & 2 \\ 0 & 3 & 1 \\ 2 & -5 & 1 \end{pmatrix}$, 求方程 $AX = B$ 的解.

解

$$\begin{aligned} (A \ B) &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 & 4 & 2 \\ 3 & 1 & 0 & 0 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 2 & -5 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 & -5 & 1 \\ 3 & 1 & 0 & 0 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & -1 & 4 & 2 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{\substack{R_2 + R_1 \times (-3) \\ R_3 + R_1 \times (-1)}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 & -5 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -6 & 18 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & 9 & 1 \end{pmatrix}, \text{故 } X = A^{-1}B = \begin{pmatrix} 2 & -5 & 1 \\ -6 & 18 & -2 \\ -3 & 9 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

6. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -1 & 4 & 2 \\ 0 & 3 & 1 \\ 2 & -5 & 1 \end{pmatrix}$, 求解矩阵方程 $AX = B$

解：构造矩阵(A, B)，做初等行变换

$$(A, B) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 & 4 & 2 \\ 3 & 1 & 0 & 0 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 2 & -5 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 & 4 & 2 \\ 0 & 1 & -3 & 3 & -9 & -5 \\ 0 & 0 & -1 & 3 & -9 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 & 4 & 2 \\ 0 & 1 & -3 & 3 & -9 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & 9 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 & -5 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -6 & 18 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & 9 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{故 } X = \begin{pmatrix} 2 & -5 & 1 \\ -6 & 18 & -2 \\ -3 & 9 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. 已知 $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$, 满足 $AX + B = 2X$, 求矩阵 X .

解：由已知得 $(2I - A)X = B$

而 $(2I - A) = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ ，运用初等变换法

$$(2I - A \quad B) = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 3 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\therefore X = \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

7. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 矩阵 X 满足 $AX = 2X + A$, 求矩阵 X

7. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 矩阵 X 满足 $AX = 2X + A$, 求矩阵 X

解 整理方程得 $AX - 2X = (A - 2I)X = A$, 其中

$$A - 2I = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix},$$

$$(A-2I \ A) = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & -1 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & -2 & 2 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 0 \end{pmatrix},$$

$$\text{故 } X = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$